

## **Post-Op Instructions After Fillings**

### **Numbness:**

When an anesthetic has been used, your lips, teeth, and tongue may be numb for several hours after the appointment. **Avoid any chewing until the numbness has completely worn off.**

### **Sensitivity:**

It is normal to experience some hot, cold and pressure sensitivity after your appointment. The larger the cavity the more sensitivity you may experience. Over the counter pain medications such as Tylenol/Ibuprofen (Advil) can be taken for lingering discomfort after the filling is done. Lingering sensitivity should subside over time. Please let us know if sensitivity occurs without a stimulus or if it awakens you. This sensitivity can be prolonged in some instances, and in extreme situations may require root canal therapy.

### **Soreness:**

Your gums may be sore for several days. Rinse three times a day with warm salt water. Put a teaspoon of salt in a cup of warm water, rinse-swish-spit to reduce pain and swelling.

### **Chewing:**

You may chew right away on white filings since they set completely during your appointment. **If your bite feels uneven, if you have persistent pain, or if you have any other questions or concerns, please call our office (713) 468-5800**

Just remember, anytime a natural tooth is worked on, there is a possibility of the need for future root canal therapy. It is impossible to predict a tooth's response. Please report any lingering discomfort.

*THE DENTAL DESIGN STUDIOS*

*8391 Westview Dr. Houston Texas, 77055*

*713-468-5800*

## **Instrucciones Postoperatorias Después De Los Empastes**

### **Entumecimiento:**

Cuando se ha utilizado un anestésico, los labios, los dientes y la lengua pueden estar entumecidos durante varias horas después de la cita. **Evite masticar hasta que el entumecimiento haya desaparecido por completo.**

### **Sensibilidad:**

Es normal experimentar algo de sensibilidad al calor, al frío y a la presión después de su cita. Cuanto más grande sea la cavidad, más sensibilidad puede experimentar. Los analgésicos de venta libre, como Tylenol/ibuprofeno (Advil), se pueden tomar para las molestias persistentes después de realizar el empaste. La sensibilidad persistente debería disminuir con el tiempo. Por favor, háganos saber si la sensibilidad se produce sin un estímulo o si le despierta. Esta sensibilidad puede prolongarse en algunos casos y, en situaciones extremas, puede requerir una terapia de conducto radicular.

### **Dolor:**

Es posible que le duelan las encías durante varios días. Enjuague tres veces al día con agua tibia con sal. Ponga una cucharadita de sal en una taza de agua tibia, enjuague, enjuague y escupa para reducir el dolor y la hinchazón.

### **Masticación:**

Puede masticar de inmediato las limaduras blancas, ya que se asentaron por completo durante su cita. **Si su mordida se siente desigual, si tiene dolor persistente o si tiene alguna otra pregunta o inquietud, llame a nuestra oficina (713) 468-5800**

Solo recuerde, cada vez que se trabaja en un diente natural, existe la posibilidad de que sea necesario una futura terapia de endodoncia. Es imposible predecir la respuesta de un diente. Por favor, informe de cualquier molestia persistente.

*THE DENTAL DESIGN STUDIOS*

*8391 Westview Dr. Houston Texas, 77055*

*713-468-5800*